

Devoir 1

A rendre le 5/03/02

Soit \mathcal{S} l'ensemble des intervalles fermés et bornés de \mathbb{R} , c'est-à-dire de la forme $[x, y]$ avec x et y réels tels que $x \leq y$. Pour deux éléments A et B de \mathcal{S} on note

$$A + B = \{x \in \mathbb{R}, \exists(a, b) \in A \times B, x = a + b\}$$

$$AB = \{x \in \mathbb{R}, \exists(a, b) \in A \times B, x = ab\}$$

1. Que vaut $[1, 2] + [-1, 5]$ et $[1, 2] [-1, 5]$?
2. Soit A et B dans \mathcal{S} . Les applications f et g définies par

$$\begin{aligned} f : A \times B &\rightarrow A + B \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : A \times B &\rightarrow AB \\ (x, y) &\mapsto xy \end{aligned}$$

sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

3. Si $A = [a, \alpha]$ et $B = [b, \beta]$ montrer que $A + B$ est un intervalle fermé et borné et trouver les bornes de cet intervalle.
4. Soit A, B et C trois éléments de \mathcal{S} montrer que $A + B = B + A$, que $(A + B) + C = A + (B + C)$ et que $A + [0; 0] = A$.
5. Si $A = [a, \alpha]$ et $B = [b, \beta]$ montrer que AB est un intervalle fermé et borné, montrer que

$$AB = [\min\{ab, a\beta, \alpha b, \alpha\beta\}, \max\{ab, a\beta, \alpha b, \alpha\beta\}]$$

6. Soit A, B et C trois éléments de \mathcal{S} ; montrer que $AB = BA$, que $(AB)C = A(BC)$ et que $A[1; 1] = A$.
7. Soit A et B dans \mathcal{S} . Montrer que si $AB = [0; 0]$ alors $A = [0; 0]$ ou $B = [0; 0]$.
8. Soit A, B et C trois éléments de \mathcal{S} montrer que $A(B + C) \subset (AB) + (AC)$. Donner un exemple où cette inclusion est stricte et un exemple où il y a égalité.
9. Trouver $X \in \mathcal{S}$ tel que $[2; 3]X = [-1; 2]$.